

4; Nouvelle-Calédonie (Aubry-Lecomte, 1863) 2; (Germain, 1875) 2; (Heurtel, 1879, 1900) 1; (Coll. A. Milne-Edwards, 1903) 2; Taïti (Culliéret, 1900) 3; (R. Blanchard, 1896) 1; J. Sandwich (Eydox, ex. déterminés par H. Milne-Edwards) 8; (Remy) 1; Pacifique (1874) 2; Cuba (Peters, 1873) 1; Guadeloupe (Lherminier, 1900) 2.

RICHARDINA SPINICINCTA A. Milne-Edwards. — Golfe de Gascogne (*Tra-vaillieur*, 1880) 1 *Type!*

— EDWARDSI Bouvier. — Maroc (*Talisman*, 1883) 2; Cap Bojador (*Talisman*, 1883) 2; Soudan : les Pilones (*Talisman*, 1883) 2 *Types!*

SPONGICOLA VENUSTA de Haan. — Japon (Musée de Leyde, 1880) 1.

— EVOLUTA E.-L. Bouvier. — Soudan : les Pilones (*Talisman*, 1883) 1 *Type!*

— INERMIS E.-L. Bouvier. — Sainte-Lucie (Blake, 1878-1879) 3 *Cotypes!*

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. MAURICE DE ROTHSCHILD
DANS L'AFRIQUE ORIENTALE.

Coléoptères : Nouvelles espèces du genre *Lagria*.

PAR M. F. BORCHMANN (DE HAMBOURG).

1. *Lagria coriacea* nov. sp.

Long., 13 millim. Oblonga, postice leviter ampliata, modice nitida, subtus nitidior, modice convexa, rufo-picea aut elytris toto brunneis, prothorace obscuriore, ore capiteque rufo, breviter griseo-pubescentis, elytris apicem versus dilutioribus; *capite* cum oculis prothorace angustiore, tenuiter rugoso-punctato, subrotundato, antice transversim impresso, inter oculos aequali; oculis nigris, angustis, fortiter emarginatis; *antennis* prothoracis basim paulo superantibus, nigris, sat gracilibus, apicem versus paulo crassioribus, articulo primo rufescente, articulo ultimo praecedenti aequali, apice acuminato; *prothorace* transverso, antice quam postice latiore, elytris valde angustiore, dense rugoso-punctato, lateribus valde arcuatis, angulis anticis obtusis, posticis rectis, lateribus vage. basi fortiter marginato; *scutello* minuto, triangulare, fulvo-piloso, elytris concolore; *elytris* ad humeros fere rectis, apice conjunctim rotundatis, transversim rugosis, inter rugas punctatis; *epipleuris* rugose punctatis, dilutioribus. Subtus rufo-brunnea, thorace griseo-villoso; *genuibus*, tibiis tarsisque nigris, *tibiis* paulo arcuatis; *metatarso* pedum posticorum eadem longitudine ac articulis tarsorum sequentium conjunctis; alata.

Habitat. — Afrique orientale anglaise. Nairobi (M. de Rothschild),

août 1906 : 1 ♀ (Mus. de Paris.) Dans ma collection se trouvent encore 4 ♀ de l'Afrique orientale allemande qui sont désignées sous le nom de *Lagria coriacea* Kolbe i. l. . Elles sont un peu moins convexes que les spécimens décrits.

2. *Lagria cyanicollis* nov. sp.

Long. 9 millim. 5 à 10 millimètres. Oblonga, postice vix ampliata, cyanea, elytris violaceo-metallicis aut cyaneis ad humeros violaceis, antennis nigris, articulo primo cyaneo, pedibus atro-cyaneis, supra subtusque nitida, griseo-pubescent; capite subrotundato, punctis magnis cribrato, inter oculos fovea transversali; antennis capite thoraceque longioribus, articulis quatuor primis nitidis, reliquis obtusis; antennis apicem versus crassioribus, articulo primo crasso, subgloboso, secundo minimo, tertio quartoque conicis, quarto praecedente paulo brevior, sequentibus brevibus, transversis, ultimo cylindrico, apice acuminato, penultimo quadruplo longiore: prothorace cylindrico, capitis latitudine, subquadrato, apicem versus attenuato, lateribus arcuato, ante basim paulo constricto, margine basali paulo elevato, crebre punctato, ante basim transversim impresso, carina mediana obsoleta, angulis anticis rotundatis, utrinque obsolete impressis; elytris thorace duplo latioribus, quadruplo longioribus, crebre punctatis, paulo rugulosis; scutello minuto, rotundato, thorace concolore; corpore subtus punctato; abdomine punctis minutis: tibiis paulo arcuatis; metatarso pedum posteriorum articulis sequentibus conjunctis aequali; alata.

Habitat. — Afrique orientale anglaise. Lac Rodolphe et Lesamisse, Rendilé, en mars (Muséum de Paris). Je possède dans ma collection 2 exemplaires de l'Érythrée, Asmara.

3. *Lagria Rothschildii* nov. sp.

Long. 8 à 9 millim. Elongata, convexa, postice ampliata, capite prothorace pedibusque cyaneis, nitida, elytris aeneis, sparsim longe albido pilosa; capite subrotundato punctis magnis cribrato, antice transversim impresso, fronte cum duabus foveis postice conjungentibus in angulo acuto; oculis modice convexis, fortiter emarginatis: antennis nigris, nitidis: capite prothoraceque aequalibus, breviter albido pubescenti: antennae articulo primo crasso, secundo minimo, tertio, quarto quintoque subaequalibus, 6-10 brevioribus, articulo ultimo cylindrico, acuminato, tribus praecedentibus conjunctis aequali: prothorace capite parum latiore, transverso, fortiter punctato, lateribus rotundatis, ante medium latissimo, angulis fere rectis, lateribus marginatis, disco inaequali; scutello prothorace concolore, apice rotundato, punctato; elytris prothorace latioribus, rude punctatis, transversim plicatulis, post scutellum obsolete impressis, humeris fere rectis, apicibus productis, acuminatis; epipleuris punctatis,

plicatulis : *thorace* subtus fortiter punctato; abdomine convexo, nitidiore, minus dense punctato, lateribus impressis; *pedibus* brevibus, femoribus tibiisque paulo arcuatis, sparsim longe pilosis; metatarso pelum posticorum articulis sequentibus aequali.

Habitat. — Afrique orientale anglaise; Escarpment. Molo, en août. 4 exemplaires. 2 exemplaires de l'Afrique orientale allemande existent dans ma collection.

DESCRIPTION DE DIPTÈRES PIQUEURS AFRICAINS

TABANIDES DU GENRE HÆMATOPOTA,

PAR M. JACQUES SURCOUF.

Hæmatopota Alluaudi ♀ nov. sp.

Type femelle provenant de l'Afrique orientale allemande, monts Kili-
mandjaro, station de Kilema, dans la zone des cultures, recueilli par
M. Charles Alluand en 1904, deux autres femelles de même provenance
et de même origine. Collection du Muséum.

Espèce voisine de *H. distincta* Ricardo (*Annals and Magazine of Natural
History*, sér. 7, vol. XVIII, August, 1906, p. 106) du Nyasaland et de
l'Afrique orientale anglaise.

Longueur, 12 à 13 millimètres.

Couleur générale brun rouge, thorax un peu assombri, abdomen uni-
colore brun rouge, sans taches. Ailes brunâtres, nervures transverses om-
brées de brun. Jambes brunes, un seul anneau aux tibiais antérieurs, deux
aux autres tibiais.

Tête brune, yeux glabres, joues rougeâtres à pubescence blanche ne
portant pas de taches noires de chaque côté; bande frontale d'un jaune
brun rétrécie vers le vertex et marquée d'une tache brune de chaque côté:
cette tache est petite et tangente aux yeux, tache médiane ovoïde, petite,
réunie par son sommet à une tache noirâtre demi-circulaire qui recouvre
tout le vertex. Callosité brun clair brillant, étroite, arrondie à son bord su-
périeur, tangente en pointe aux yeux, le bord postérieur sinué. Palpes
allongés jaune noirâtre à poils jaunâtres. Antennes : 1^{er} et 2^e articles noirs
à pubescence noire, 3^e article rougeâtre à la base.

Thorax brun, flancs et pectus gris rougeâtre; bandes latérales plus
claires que le fond, peu distinctes; bandes médianes claires, étroites, ter-
minées par une petite tache plus claire un peu en avant de la suture trans-
verse; la partie postérieure du thorax est recouverte par une tache rectan-
gulaire qui s'étend sur le scutellum; celui-ci est brun rougeâtre et porte
quelques poils incolores.